

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII - CITRAFLEET

Dieta:

3 dni przed badaniem **nie spożywać:**

- tłustych wędlin (np. kiełbasy) i mięsa, zwłaszcza czerwonego,
- sałatek, warzyw i owoców pestkowych,
- pestek (np.: siemię lniane, mak, winogrona, pomidory, kiwi, truskawki itp.),
- kapusty, fasoli, grochu,
- ciemnego pieczywa,
- napojów gazowanych, przecierów owocowych.

Zalecane: Dieta półpłynna, kisiele, kleiki, ryż, makaron, chleb bez ziaren, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane klarowne, herbata, kawa (bez fusów).

W przeddzień badania:

Lekkostrawne śniadanie: herbata, bułeczka (bez mleka, surowych warzyw i owoców, napojów gazowanych). Godz. 14⁰⁰-15⁰⁰ poprzedzony bulion. Po godz. 15⁰⁰ woda niegazowana, herbata, można ssać landrynki, miód

DAWKOWANIE LEKU CITRAFLEET (receptę na lek wystawia lekarz, który skierował na badanie):

W dniu poprzedzającym badanie ok. godz 16:00, należy przyjąć pierwszą dawkę leku CITRAFLEET PLUS DODATKOWO NALEŻY WYPIĆ 2 LITRY NIEGAZOWANEJ WODY (w celu właściwego oczyszczenia jelita),

W dniu badania, na 3-5 h przed badaniem należy przyjąć drugą dawkę leku CITRAFLEET PLUS DODATKOWO NALEŻY WYPIĆ 2 LITRY NIEGAZOWANEJ WODY, w przeciągu 1-1,5h.

Wypić wszystko najpóźniej do 2 godzin przed planowanym badaniem

Sposób przygotowania preparatu CITRAFLEET: Wsypać zawartość 1 saszetki do szklanki wody (około 150 ml). Powstała zawiesina będzie mętna. Należy mieszać zawartość szklanki przez 2–3 minuty.

W dniu badania bez jedzenia i picia (leki nasercowe i na nadciśnienie przyjąć popijając małą ilością wody około godziny 6⁰⁰ rano). Podczas przygotowania nie należy przyjmować leków na cukrzycę.

Osoby przyjmujące leki p/płytkowe i p/krzepliwe („na rozrzedzenie krwi”) Acard, Polocard, Ticlo, Sintrom, Warfin, Pradaxa, Xarelto itp. powinny je odstawić w porozumieniu z LEKARZEM PROWADZĄCYM.